



Očekávaná změna počtu generací lýkožrouta smrkového (*Ips typographus*) v přírodní lesní oblasti (PLO) Rakovnicko-kladenská pahorkatina v období 2021–2050 oproti období 1961–1990

Autor: T. HLÁSNY, J. HOLUŠA, M. TURČÁNI



PLO RAKOVNICKO KLADENSKÁ PAHORKATINA

PLO Rakovnicko-kladenskou pahorkatinu o celkové rozloze 157 946 ha tvoří Kladenská a Rabštejnsko-jesenická pahorkatina. Les pokrývá 465 km². Nejvyšším bodem je Džbán (535 m n. m.). Průměrná roční teplota se pohybuje mezi 7-8,2 °C, roční úhrn srážek činí 460-570 mm. V oblasti se vyskytuje 2. a 3. vegetační stupeň s kyselými bukovými doubravami, dubovými bučinami a se stanovišti po dávno zaniklých jedlových doubrav na oglejených půdách. Přirozená skladba lesa je charakteristická velkým zastoupením dubu (45,6 %) a buku (34,8 %), přiměsi borovice (8,9 %), jedle (5,1 %), habru (1,4 %), břízy (1,4 %), lipy (1%), olše (0,8 %) a podílem javoru (0,5 %), jasanu (0,3 %) a smrku (0,2 %). Současná dřevinná skladba pozůstává ze 46 % borovice, 35,5 % smrku, 4,1 % modřínu a dubu, 3,4 % buku, 2,9 % břízy, 0,9 % lipy, 0,6 % javoru, 0,5 % akátu, 0,4 % jasanu, 0,3 % topolu, 0,2 % habru, 0,1 % jedle a olše a 1 % ostatních dřevin. Problém je v této oblasti chrádat les v důsledku přemnožení kůrovčů (*Ips typographus* a *Pityogenes chalcographus*) a klikorohy borového (*Hylobius abietis*).

MODEL PRO VÝPOČET ZMĚNY POČTU GENERACÍ

Analýza vývoje lýkožrouta smrkového byla založena na modelu PHENIPS - Komplexní fenologický model lýkožrouta smrkového *Ips typographus* (Baier a kol. 2007). V rámci tohoto modelu určuje maximální denní teplota vzduchu den nástupu napadení a průměrná teplota kůry určuje rychlosť vývoje jednotlivých vývojových stadií. Začátek napadení hostitelské dřeviny na jaře je určován na základě teplotního limitu 16,5 °C pro letovou aktivitu a sumou teplot nad tu hranici 140 stupňodní (degree-days) kumulovaných od 1. března. Vývoj potomstva je ukončen po dosažení 557 stupňodní nad prahovou hodnotu 8,3 °C. K ukončení reprodukční aktivity lýkožrouta dojde při dosažení délky slunečního svitu 14,5 hodiny. Průměrná teplota kůry je určena regresí průměrné denní teploty vzduchu a sluneční radiace. Na vývojové stadium vajíčka připadá 12 % celkové délky vývoje dospělého jedince, 35 % připadá na stadium larvy a 13 % na stadium kukly.

Části PLO (varianta A) a části jehličnatých porostů PLO (varianta B) s klimatickými podmínkami umožňujícími vývoj *n*-generaci lýkožrouta smrkového. Jsou uvedeny % z celkové rozlohy PLO (A) nebo jehličnatých porostů v PLO (B).

	2 generace	3 generace	4 generace			
Varianta	A	B	A	B	A	B
1961-1990	64	80	36	20	-	-
2021-2050	31	46	69	54	-	-
2071-2100	-	-	79	93	21	7